

Consommation de tabac et d'alcool

Le tabac et l'alcool constituent des facteurs de risque majeurs pour au moins deux des principales causes de mortalité précoce : les maladies cardiovasculaires et le cancer.

En moyenne, la proportion de fumeurs quotidiens dans la population adulte était de 18 % environ en 2017 (graphique 7.13). En gardant à l'esprit les problèmes de mesure, il semble que les écarts de résultats entre les pays de l'OCDE soient profonds. Les taux de tabagisme étaient les plus bas au Mexique et en Islande (moins de 10 % de la population adulte) et les plus élevés en Grèce, en Hongrie et en Turquie (plus de 25 %). Ils sont plus importants chez les hommes que chez les femmes dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE, sauf en Suède et en Islande, où l'écart entre les sexes est inférieur à 1 %. Hormis l'Autriche et la République slovaque, tous les pays de l'OCDE ont connu un recul marqué de leur taux de tabagisme au cours des dix-huit dernières années. En moyenne, dans l'ensemble de l'OCDE, le taux a diminué de plus d'un quart, passant de 26 % en 2000 à 18 % en 2017. Des réductions particulièrement importantes ont été enregistrées en Irlande, aux Pays-Bas et en Norvège. Parmi les pays partenaires de l'OCDE, le taux de tabagisme est en général faible au Brésil (7 %) et élevé en Indonésie et dans la Fédération de Russie (plus de 30 %).

La consommation d'alcool, mesurée par les données enregistrées sur les ventes annuelles, s'établit à 8,8 litres d'alcool pur par adulte, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, sur la base des données disponibles les plus récentes (graphique 7.14). C'est la France, la Lituanie et la République tchèque qui déclarent la plus forte consommation d'alcool, avec 11,5 litres ou plus par adulte par an. La consommation d'alcool est faible en Turquie et en Israël, ainsi que dans les économies émergentes que sont l'Indonésie et l'Inde, où les traditions religieuses et culturelles limitent la consommation d'alcool chez certaines catégories de la population. Bien que la consommation moyenne d'alcool ait légèrement reculé dans de nombreux pays de l'OCDE depuis 2000 – une baisse d'environ 0,7 litre par adulte en moyenne –, elle a augmenté de deux litres ou plus en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, ainsi que dans des pays partenaires clés comme la Chine et l'Inde. Une analyse de l'OCDE fondée sur des données individuelles montre que les hommes ayant un faible statut socio-économique sont plus susceptibles de consommer de grandes quantités d'alcool que les hommes au statut socio-économique élevé, alors que l'on observe l'inverse chez les femmes (OCDE, 2015).

Les adolescents deviennent dépendants plus rapidement que les adultes, et la consommation régulière de tabac et d'alcool est associée à de plus mauvais résultats sur les plans psychologique, social, physique et scolaire, ainsi qu'à la violence, aux blessures, à la toxicomanie et aux comportements sexuels à risque (OCDE, 2015). **En moyenne, un jeune de 15 ans sur huit déclare fumer au moins une fois par semaine.** La proportion de fumeurs chez les adolescents est comprise entre moins de 5 % au Canada, en Islande et en Norvège et 20 % environ en France, en Hongrie et en Italie (graphique 7.15). Les taux sont particulièrement supérieurs chez les garçons dans la Fédération de Russie, en Finlande, en Israël et en Lituanie, alors que l'inverse est vrai au Luxembourg et en République tchèque.

Quant à l'ivresse, **en moyenne, un jeune de 15 ans sur cinq déclare avoir déjà été en état d'ébriété au moins deux fois.** Les taux vont de 10 % en Israël à plus de 35 % au Danemark, en Hongrie et en Lituanie (graphique 7.16). Les garçons sont davantage susceptibles que les filles d'avoir déjà été ivres, notamment en Autriche, dans la Fédération de Russie, en Hongrie, en Israël, en Italie, en Lettonie, en Lituanie et en Suisse. Le Royaume-Uni est le seul pays où les épisodes déclarés d'ébriété sont plus fréquents chez les filles que chez

Définition et mesure

La proportion de fumeurs quotidiens est égale au pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui déclare fumer tous les jours. La comparabilité internationale est limitée en raison du manque d'harmonisation des enquêtes de santé menées dans les différents pays de l'OCDE pour ce qui est de mesurer les habitudes de consommation de tabac.

Des différences sont observées dans les groupes d'âge visés par les enquêtes, le libellé des questions, les catégories de réponse et les méthodes d'enquête utilisées (par exemple, dans un certain nombre de pays, les répondants sont invités à indiquer s'ils fument « régulièrement », au lieu de « quotidiennement »). Les comportements auto-déclarés peuvent aussi être influencés par un biais de désirabilité sociale, ce qui peut nuire à la comparabilité des résultats entre les pays.

La consommation d'alcool est mesurée sur la base des ventes annuelles d'alcool pur, en nombre de litres par personne âgée de 15 ans et plus. Toutefois, la méthode utilisée pour convertir les boissons alcoolisées en alcool pur peut varier d'un pays à l'autre. Les statistiques officielles ne rendent pas compte de la consommation d'alcool non recensée, par exemple la consommation d'alcool provenant de la production domestique, qui est plus courante dans certains pays que dans d'autres.

Les taux de consommation de tabac et d'alcool chez les jeunes de 15 ans, ventilés par sexe, sont issus de l'étude de 2013/14 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), qui recueille des informations sur de nombreux facteurs socio-économiques qui influencent les comportements de santé chez les enfants dans 26 pays de l'OCDE. Les indicateurs présentés ici par sexe correspondent au pourcentage de jeunes de 15 ans qui fument au moins une fois par semaine et de ceux qui ont été en état d'ivresse à au moins deux reprises.

Pour en savoir plus

Inchley, J et al. (dir. pub.), *Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2013/2014 survey*. Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 2016 (Health Policy for Children and Adolescents, n° 7), www.hbsc.org/publications/international.

OCDE (2015), *Lutter contre la consommation nocive d'alcool : Politiques économiques et de santé publique*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264244580-fr>.

OCDE (2017), *Panorama de la santé 2017 : Les indicateurs de l'OCDE*, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/health_glance-2017-fr.


Notes des graphiques

Graphique 7.13 et Graphique 7.14 : Voir Statlink pour les années précises.

Graphique 7.15 et Graphique 7.16 : Les données pour la Belgique ont été calculées à partir des parts de population de la Communauté flamande (60 %) et de la Communauté française (40 %) ; les données pour le Royaume-Uni ont été calculées à partir des parts de population de l'Angleterre (85 %), de l'Écosse (9 %) et du Pays de Galles (5 %).

7.13. Nette diminution des taux de tabagisme chez les adultes dans la plupart des pays de l'OCDE

Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus qui fume quotidiennement, selon le sexe, en 2000 et 2017 (ou années les plus proches)




Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2018, <https://doi.org/10.1787/health-data-fr>.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933939522>

7.14. Léger recul de la consommation d'alcool chez les adultes dans de nombreux pays de l'OCDE

Litres d'alcool pur par personne âgée de 15 ans et plus, en 2000 et 2016 (ou années les plus proches)




Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2018, <https://doi.org/10.1787/health-data-fr>.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933939541>

7.15. Un jeune de 15 ans sur huit fume au moins une fois par semaine

Pourcentage des jeunes de 15 ans qui fument au moins une fois par semaine, selon le sexe, en 2013/14




Source : Inchley, J. et al. (dir. pub.), Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2013/2014 Survey. Copenhagen, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 2016 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7), www.hbsc.org/publications/international.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933939560>

7.16. Un jeune de 15 ans sur cinq a déjà été ivre au moins deux fois

Pourcentage des jeunes de 15 ans ayant déjà été ivres au moins deux fois, selon le sexe, en 2013/14



Source : Inchley, J. et al. (dir. pub.), Growing up unequal: Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2013/2014 Survey. Copenhagen, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 2016 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7), www.hbsc.org/publications/international.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933939579>



Extrait de :
Society at a Glance 2019
OECD Social Indicators

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2019), « Consommation de tabac et d'alcool », dans *Society at a Glance 2019 : OECD Social Indicators*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/063774f8-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.